1 Objectifs

Après avoir exploré les liens entre la loi exponentielle et la loi de Poisson, on met en évidence un paradoxe connu sous le nom de *paradoxe du bus*.

2 Cadre

λ désigne un réel de $]0; +\infty[$. Dans les simulations informatiques, λ prendra la valeur $1/10$, l'unité de temps sera la minute. On étudie ici une ligne de bus pour laquelle on suppose que le temps T séparant le passage entre deux bus suit une loi exponentielle de paramètre λ et est indépendant des temps de passage précédents.

☞ La ligne de bus est mise en service à l'instant $t = 0$;
 ☞ pour $k \in \mathbb{N}^*$, T_k désigne le temps écoulé entre le passage du $(k-1)^{\text{ème}}$ et du $k^{\text{ème}}$ bus, T_1 désignant l'heure de passage du premier bus;

☞ pour $i \in \mathbb{N}^*$, $U_i = \sum_{k=1}^i T_k$ est ainsi l'heure de passage du $i^{\text{ème}}$ bus;

☞ pour $t > 0$, N_t désigne le nombre de bus passés entre les instants 0 et t .

Les hypothèses de la modélisation sont :

pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $T_i \leftrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$ et
 les variables $(T_i)_{i \geq 1}$ sont mutuellement indépendantes.

3 Nombre de bus passant en un temps donné

3.1 Simulations et conjecture

- Pour $\lambda = 1/10$, quelle est la durée moyenne séparant le passage de deux bus ?
- On rappelle que

```
grand(1,1,'exp',m)
```

simule une variable aléatoire de loi exponentielle d'espérance m .

- a) Que simule la fonction suivante ?

```
function y=nbus(lambda,duree)
y=0;
t=grand(1,1,'exp',1/lambda);
while t<duree then
    t=t+grand(1,1,'exp',1/lambda);
    y=y+1
end
endfunction
```

- b) Compléter l'algorithme suivant

```
duree=input('duree ?' )
n=.....;
simul=zeros(1,n);
for k=1:n
    simul(k)=nbus(..... , .....);
end
disp(mean(simul)); disp(variance(simul))
```

afin qu'il simule 10000 fois le comptage du nombre de passages de bus entre les instants $t = 0$ et $t = \text{duree}$, puis affiche la moyenne et la variance calculées sur ces 10000 simulations.

- c) Compléter le tableau suivant :

durée	0h30	1h00	1h30	2h00
moyenne				
variance				

Quelles conjectures peut-on formuler grâce moyennes et variances observées ?

3.2 Étude expérimentale d'une conjecture

- Parmi les lois discrètes, quelle est la seule pouvant être en accord avec les conjectures précédentes ?
 - En notant d la durée, quelle conjecture peut-on faire sur le lien entre le paramètre de cette loi et la durée d ?
 - Afin d'établir une conjecture sur le lien entre d et le paramètre λ de la loi exponentielle des T_k , effectuer à nouveau un jeu de simulations semblables à celles de la question 2, et remplir un tableau analogue à celui de 2.c), en prenant $\lambda = 1/5$ puis $\lambda = 1/20$.
 - Quelle conjecture peut-on émettre sur le lien entre λ et d ?
- Comparaison à une distribution de Poisson*

Afin de valider l'hypothèse

$\mathcal{H} : \ll N_t \text{ suit une loi de Poisson } \mathcal{P}(\lambda t) \gg$

nous allons comparer graphiquement les fréquences des différentes valeurs obtenues lors des simulations et la distribution théorique d'une loi de Poisson.

 - Exécuter le script de la question 2 en prenant à nouveau $\lambda = 1/10$, afin d'obtenir un vecteur `simul` contenant 10000 simulations de la variable N_{60} .
 - Exécuter le script suivant et expliquer ce qu'il trace.

```

classes=0:1:max(simul);
m=mean(simul)
freqtheo=exp(-m)*m.^classes ./factorial(classes);
plot2d(classes,cumsum(freqtheo))

```

- c) On admet que la fonction `frequence` ci-après, appliquée à un vecteur x , permet d'obtenir un vecteur donnant les fréquences d'apparition de tous les entiers de 0 à $\max(x)$. Exécuter le script suivant et expliquer ce qu'il trace.

```

function y=frequence(x)
    l=length(x)
    x=[x,0:1:max(x)]
    y=tabul(x,"i")
    y=y(:,2)
    y=(y-1)/l
endfunction
freqsim=frequence(simul);
plot2d(classes,cumsum(freqsim),-1)

```

- d) Superposer les deux tracés précédents. Que révèlent clairement ces tracés?

3.3 Justification théorique

5. a) Rappeler, pour $i \in \mathbb{N}^*$, la loi de λU_i .
 b) Soit $t \in]0; +\infty[$ et $k \in \mathbb{N}^*$.
 Comparer les événements $[N_t \geq k]$ et $[U_k \leq t]$ et en déduire que N_t suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda t)$.

4 Le paradoxe du bus

La ligne de bus est mise en service à 6 heures du matin. Bien qu'il y ait en moyenne 10 minutes entre le passage de deux bus consécutifs (on reprend $\lambda = 1/10$), un passager probabiliste qui se présente tous les jours à 9 heures 5 minutes précises à l'arrêt de bus, s'étonne que son temps d'attente soit souvent plus élevé que 5 minutes. Peut-on l'aider à optimiser sa stratégie?

Dans cette partie, le temps est toujours compté en minutes, et $t = 0$ correspond à 6 heures du matin.

6. a) Compléter la fonction suivante pour qu'elle simule les passages des bus depuis 6 heures et jusqu'au premier bus que peut prendre le passager, et qu'elle renvoie alors le temps d'attente du passager.

```

function y=attente()
    t=0;
    while t<..... then
        t=t+grand(1,1,'exp',10);
    end
    y=.....
endfunction

```

- b) Exécuter plusieurs fois `attente()`.
 L'impression du passager se confirme-t-elle?
- c) Afin de préciser cette impression, écrire un script réalisant 1000 simulations et calculant la moyenne des temps d'attente obtenus. Conclusion?
7. Modifier le script précédent pour simuler le temps d'attente lorsque le passager se présente à 9 heures précises, puis à 9 heures 10. Qu'observez-vous?
8. Modifier le script pour simuler le temps d'attente lorsque le passager se présente à un instant quelconque entre 9 heures et 9 heures 10 (son heure d'arrivée à l'arrêt de bus suivant la loi uniforme sur $[180; 190]$). Qu'observez-vous?
9. Un conseil à prodiguer au passager?
10. Transformer la fonction `attente()` en une fonction `ecart()` donnant le temps écoulé entre le bus pris par le passager et le bus précédent.
 Exécuter plusieurs fois `ecart()`, puis réaliser 1000 simulations et calculant la moyenne des écarts obtenus.
 Paradoxal, non?